Prunus (*Rosaceae*)

Le varietà del genere Prunus sono quasi tutte originarie delle regioni temperate dell'emisfero boreale. Eccetto alcune varietà, sono tutti alberi o arbusti a foglia caduca che fioriscono in primavera con fiori molto ornamentali e decorativi. Vengono impiegate anche come alberi da frutto.

“Accolade”
(P. sargentii “Accolade”)

Ornamentale, originario dell'Inghilterra, chioma tondeggiante, con rami pendenti alle estremità. Foglie verdi in primavera, gialle-arancioni in autunno, ellittiche dai margini seghettati, di 8-12 cm. Fiorisce a marzo-aprile con mazzi di fiori rosa acceso di 4 cm. Rustico, necessita una potatura leggera dopo la fioritura, ma sopporta anche le potature drastiche. Viene usato da solo o nelle siepi libere, e può essere coltivato anche in vaso.

avium,
Ciliegio dolce, Ciliegio selvatico

Albero dalla chioma ovale o tondeggiante, fusto eretto e corteccia marrone-rossa. Foglie caduche verdi in primavera, gialle ambra in autunno, ovali, di 6-15 cm. Fiorisce copiosamente prima delle foglie con fiori bianchi, semplici, di 2,5 cm. Produce ciliege piccole e rosse, eduli, dal sapore dolce o agrodolce. Cresce nei terreni permeabili e argillosi, usato per generare innesti, e cresce nei boschi.

avium “Plena”

Albero originario della Francia. Corteccia, chioma, foglie, esigenze colturali e impieghi uguali alla specie tipo. I fiori sono bianchi, doppi, e si aprono 1-2 settimane prima di P. avium.

x blireana

Incrocio tra P. cerasifera "Pissardii e P. mume "Alphandii", grande arbusto o albero dalle foglie color rosso-marrone, fiori doppi e copiosi, rosa acceso, che anticipano le foglie a marzo-aprile. Stessi impieghi ed esigenze colturali di Prunus cerasifera "Pissardii".

caroliniana

Arbusto o albero originario dell'America occidentale dalla chioma densa e le foglie sempreverdi appuntite e strette, di colore verde lucido. I fiori bianchi, molto decorativi, sono raccolti in racemi ascellari. Necessita un terreno fertile e permeabile, viene impiegato da solo o nelle siepi.

cerasifera “Pissardii” (P. cerasifera “Atropurpurea”)

Grande arbusto ornamentale originario degli Stati Uniti dalla chioma densa e tondeggiante e la corteccia violacea, specie in gioventù. Foglie caduche rosse accese al nascere, che in seguito diviene più scuro, ovali e lunghe 5-7 cm. Fiorisce copiosamente sui legni nudi dell'anno precedente con fiori semplici, di 2-3 cm, rosa acceso. Fruttifica con sporadiche prugne rosse, eduli. Cresce nei terreni da giardino, anche quelli secchi, ma preferisci quelli freschi e ben drenati. Resiste all'inquinamento e alle potature lievi (dopo la fioritura ne necessita una di contenimento), viene impiegato lungo le strade strette.

cerasifera “Hollywood” (P. trailblazer)

Arbusto o albero dai rami spinosi e la chioma tondeggiante. Foglie rosse scure in primavera, marroni d'estate. Fiorisce a marzo-aprile coprendo tutti i rami di fiori bianchi prima delle foglie. Produce frutti rossi belli da vedere. Le esigenze colturali e gli impieghi sono gli stessi di P. cerasifera “Pissardii”.

fruticosa “Globosa”

Arbusto originario del Caucaso dai rami corti che se innestato in testa mantiene naturalmente una chioma tondeggiante. Foglie caduche verdi scure, ellittiche, lunghe 5-6 cm e larghe 2-3. Fiorisce ad aprile con fiori bianchi e semplici, fruttifica con ciliegine rosse commestibili e sporadiche. Necessita di terreni umidi e ricchi, non soffre il calcare.

x hillieri “Spire”

Alberello dalla chioma a imbuto. Foglie caduche verdi accese in primavera, gialle, arancioni e rosse in autunno, ovali, acuminate e seghettate. Fiorisce copiosamente prima delle foglie con fiori semplici rosa chiaro. Cresce in tutti i terreni da giardino, adatto ai giardini piccoli e alla coltivazione in vaso.

laurocerasus "Caucasica",
Lauroceraso

Arbusto originario del Caucaso dalla chioma ascendente e densa. Foglie sempreverdi di colore verde acceso con la pagina inferiore più chiara, dure, ovali, dai margini seghettati, lunghe 15-18 cm e larghe 3-6. Fiorisce ad aprile-maggio con racemi eretti di 8-12 cm formati da fiori bianchi. Produce frutti di 1 cm, rossi inizialmente e neri quando maturano. Cresce in tutti i terreni ma prospera in quelli umidi, ricchi, acidi o alcalini, ha bisogno di luce e resiste alle potature e alle basse temperature. Viene spesso coltivato ad alberetto, e viene spesso usato anche per le siepi.

laurocerasus "Rotundifolia",
Lauroceraso a foglie rotonde

Arbusto dalla chioma densa, eretta in gioventù, tondeggiante poi. Foglie sempreverdi verdi chiare, ovali o ellittiche, dai bordi dentellati, lunghe 9-12 cm e larghe 5-7, dalla punta arrotondata. Le altre caratteristiche sono uguali alla specie descritta sopra.

laurocerasus “Etna”® (“Anbri”)

Arbusto dalla chioma tondeggiante e folta. Foglie sempreverdi verdi scure con sfumature rosse scure in gioventù, dure, lunghe 13 cm e larghe 6, dai margini leggermente seghettati. I fiori sono raccolti in infiorescenze di 20 cm bianche, i frutti sono neri. Resiste all'inquinamento industriale e viene usato da solo o in gruppi per formare barriere.

laurocerasus “Novita”

Varietà di Prunus l. “Caucasica” dalle foglie più dure e più lunghe, e più resistente alle malattie. Le altre caratteristiche sono uguali a P. laurocerasus “Caucasica”.

laurocerasus “Otto Luyken”

Come P. laurocerasus “Caucasica” ma con foglie ellittiche, lunghe 8-10 cm e larghe 2-3 cm, e i fiori raccolti in racemi che fioriscono ad aprile-maggio.

lusitanica,
Lauro del Portogallo

Arbusto originario della Spagna e del Portogallo dalla chioma tonda ed espansa, che può essere educato ad albero maestoso o a mezzo fusto. Foglie sempreverdi verdi scure, ovali, acuminate e coi bordi dentellati, lunghe 6-15 cm e larghe 4-6. Fiorisce sui legni dell'anno prima con spighe di fiori bianchi di 15-25 cm, profumati. Fruttifica in seguito da grappoli di 10 cm di frutti viola scuri. Rustico in fatto di terreno, soffre le forti escursioni termiche, le precipitazioni forti e le alte quote. Resiste alle potature non drastiche, viene impiegato da solo o in gruppo, così come per siepi libere e barriere.

lusitanica “Angustifolia”

Varietà di P. lusitanica dalla crescita più lenta, la chioma piramidale e folta, le foglie più piccole e strette. Tutto il resto è uguale alla specie tipo.

maackii “Amber Beauty”

Grande arbusto o alberello dai rami eretti e il tronco giallo scuro. Foglie caduche, fiori bianchi che spuntano in grappoli ad aprile, frutti neri.

mume “Pendula”,
Albicocco giapponese da fiore

Alberello dalla chioma ricadente. Foglie verdi caduche, ovali, seghettate, di 4-8 cm. Fiorisce a febbraio-marzo con fiori rosa chiari doppi o semidoppi. Impiegato nei giardini piccoli.

“Okame”

Arbusto o piccolo albero dalla chioma densa. Fiorisce a marzo-aprile con mazzi ricadenti di fiori rosa accesi con gli stami gialli.

padus, Pado

Arbusto o alberello dalla chioma folta e ovale e la corteccia grigia. Foglie verdi chiare con la pagina inferire bluastra, che in autunno diventano gialle o rosse, rigide e seghettate. Fiorisce ad aprile-maggio con spighe pendenti di fiori bianchi e piccoli, fruttifica con frutti neri. Vive anche nei terreni torbosi, ma preferisce quelli silicei.

serrulata "Amanogawa" (P. serrulata "Erecta")

Albero ornamentale dal fusto diramato alla base e la chioma colonnare. Foglie caduche verdi chiare in primavera, gialle con sfumature rosse scure in autunno, ellittiche e lunghe 8-12 cm. Fiorisce copiosamente ad aprile-maggio con fiori semidoppi rosa chiari e profumati. Cresce in tutti i terreni permeabili.

serrulata “Kanzan”
(P. serrulata “New Red”),
Ciliegio giapponese da fiore

Ciliegio da fiore originario della Cina, arbusto o alberello dalla chioma allargata. Foglie caduche inizialmente marroni, poi verdi accese e gialle-arancioni in autunno. Boccioli rossi che si schiudono in fiori rosa accesi, doppi, a mazzi di 2-5. Stesse esigenze colturali della varietà precedente, impiegato da solo o in gruppi, e per le alberature.

serrulata
“Kiku-shidare-zakura”,
Ciliegio da fiore a rami pendenti

Albero dalla chioma piangente. Foglie caduche marroni inizialmente, verdi accese poi, ellittiche e lunghe 8-10 cm. Fiorisce ad aprile assieme alle prime foglie, con mazzi di 4-6 fiori doppi rosa. Stesse esigenze colturali di P. serrulata “Amanogawa”, viene impiegato da solo nei prati.



serrulata “Pink Perfection”

Simile a P. s. “Kanzan” ma dai rami meno rigidi e la chioma leggermente ricadente. Foglie, fiori, esigenze colturali e impiego uguali a “Kanzan”, non fruttifica.

serrulata “Royal Burgundy”,
Ciliegio giapponese a foglie rosse

Grande arbusto o alberello dalla chioma tondeggiante, mutazione di P. s. “Kanzan” dalle foglie rosse scure. I fiori sono uguali ma di un rosa più acceso. Necessita terreni freschi, ben drenati e ricchi, viene impiegato in giardini, viali e parchi.

serrulata “Shiro-fugen” (P. serrulata “Alborosea”)

Arbusto o alberello dalla chioma a ombrello. Foglie di un bel rosso in autunno. Boccioli bianchi-rosa che si aprono in fiori bianchi doppi. Esigenze colturali e impiego uguali a P. “Kanzan”.

serrulata “Sunset Boulevard”

Albero o grande arbusto coi rami dalle estremità ricadenti. Foglie caduche verdi e marroni in primavera. Fiori a coppa, bianchi con bordi rosa. Non produce frutti, esigenze colturali e impieghi uguali a P. “Kanzan”.

serrulata “Tai Haku”

Grande arbusto o alberello dalla chioma allargata. Foglie caduche grandi, inizialmente marroni-rosse, poi verdi, infine gialle o arancioni. Boccioli rosa che rivelano fiori bianchi. Esigenze colturali e impiego uguale a P. “Kanzan”.

subhirtella “Autumnalis”

Arbusto o alberello dalla chioma allargata. Foglie caduche verdi in primavera, gialle arancioni in autunno, ovali, dai bordi seghettati, di 6-8 cm. Boccioli rosa, fiori semidoppi rosa molto chiaro, inizia a fiorire a inizio inverno, ma la fioritura importante avviene a marzo. Esigenze colturali e impiego uguali a P. s. “Amanogawa”.

subhirtella “Autumnalis Rosea”

Come la varietà precedente, ma coi fiori rosa chiari con gola rosa-rossa.

subhirtella “Pendula”

Alberello innestato in testa dai rami lunghi e ricadenti, quasi fino a toccare terra. Foglie caduche verdi scure in primavera, gialle e rosse in autunno, ovali, dentate. Fiorisce precocemente a marzo-aprile con boccioli rosa e fiori rosa chiaro, molto numerosi. Esigenze colturali uguali a P. s. “Amanogawa”, viene usato da solo in gruppo nei prati.

subhirtella “Pendula Rosea”

Come il precedente, ma i boccioli sono rossi e i fiori sono rosa acceso.

“Umineko”
(P. incisa x speciosa)

Alberello o arbusto dalla chioma colonnare. Foglie rossastre inizialmente, poi verdi e arancioni-rosse in autunno, ovali e grandi 5-6 cm. Fiori bianchi, semplici, di 2-3 cm con stami gialli. Stesse esigenze colturali di P. serrulata “Kanzan”.

virginiana “Shubert”

Albero originario del Nord Dakota dalla chioma ovale. Foglie verdi chiare inizialmente, poi rosse. Fiorisce a metà primavera con spighe pendule di fiori bianchi-rosa con gola rossa, seguita da frutti rossi scuri. Cresce in tutti i terreni, viene impiegato da solo o in gruppi, e per le alberature.

x yedonensis (P. speciosa x subhirtella),
Ciliegio di Tokyo

Alberello dai rami arcuati. Foglie caduche verdi accese, ovali, di 6-10 cm. Grappoli di fiori a stella gialli chiari o gialli-verdi. Frutti alati molto ornamentali, che restano sulla pianta fino a fine autunno. Cresce in tutti i terreni, ma preferisce quelli ricchi. Resistente all'inquinamento.