

Robinia

Robinia (*Fabaceae*)



elliottii (R. boyntonii) (R. hispida rosea), Acacia rosa

Alberello o arbusto originario delle zone sud-orientali degli USA dalla chioma rada e allargata. Foglie caduche di 20 cm formate da foglioline verdi accese con la pagina inferiore grigia. Fiorisce a maggio-giugno con grappoli di 15 cm di fiori rosa chiaro, grandi. I frutti sono legumi piatti di 5-10 cm. Cresce anche nei suoli poveri e secchi, necessita una barriera contro il vento a causa dei suoi rami esili. Resiste all'inquinamento e viene piantato in associazione ad arbusti più bassi o da solo.

x margaretta "Casque Rouge" (R. margaretta "Pink Cascade") (R. pseudoacacia "Casque Rouge"), Robinia rossa

Albero originario degli USA dalla chioma ascendente e tondeggiante, i rami inizialmente spinosi e la corteccia liscia. Foglie caduche inizialmente marroni, poi verdi, formate da 11-21 foglioline. Fiorisce abbondantemente a maggio-giugno con grappoli di fiori rossi scuri di 2-3 cm, profumati. Necessita un'esposizione riparata dai venti, resiste all'inquinamento, e ha le stesse esigenze colturali della varietà descritta sotto. Viene impiegata da sola come albero da ombra, o nei viali.



Robinia



pseudoacacia, Robinia comune

Albero originario degli Stati Uniti orientali dalla corteccia grigia e rugosa, la chioma espansa, i rami spinosi e spigolosi. Foglie caduche di 30 cm formate da 9-19 fogliole ellittiche, verdi accese con la pagina inferiore bluastra. Fiorisce a maggio-giugno con grappoli pendenti di fiori bianchi, di 15-25 cm. I frutti sono legumi sessili e lineare, di 5-10 cm. Cresce in tutti i terreni eccetto quelli non sciolti e argillosi, preferendo quelli leggeri e calcarei. Viene spesso impiegato per rinsaldare terreni in dissesto grazie alle sue radici, o per dare fertilità a terreni poveri, arricchendoli di azoto.

pseudoacacia "Bessoniana"

Selezione che si riproduce per innesto dal fusto eretto, la chioma regolare e densa e la fioritura meno abbondante di *R. pseudoacacia*. Stesse foglie ed esigenze colturali, viene impiegata nei viali alberati.





pseudoacacia "Unifolia" (*R. pseudoacacia* "Monophylla")

Albero dal fusto eretto, la chioma conica e regolare e rami non spinosi. Foglie caduche formate da 3-7 fogliole verdi scure in primavera e gialle in autunno, ovali. Fiorisce a maggio con grappoli grandi fino a 15 cm di fiori bianchi profumati. Esigenze colturali di *R. pseudoacacia*.

pseudoacacia "Frisia"

Albero originario dell'Olanda dai rami poco spinosi e la chioma inizialmente colonnare, poi tondeggiante. Foglie di 20-30 cm formate da fogliole di 4 cm gialle accese. Fioritura e fruttificazione meno copiosa di *R. pseudoacacia*, ma dalle caratteristiche uguali, così come le esigenze colturali.



Robinia



**pseudoacacia "Twisty Baby"®
(R. pseudoacacia "Lace Lady")**

Robinia nana dai rami spigolosi e pendenti alle estremità. Usata in fioriere e nei giardini rocciosi, può essere innestata a mezzo fusto creando un alberello dai rami cadenti e la chioma larga.

**pseudoacacia "Umbraculifera"
(R. pseudoacacia inermis),
Robinia ombrella**

Alberello dalla chioma densa e naturalmente sferica. Foglie caduche simili a quelle della specie tipo, ma più piccole, mentre i fiori sono assenti. Cresce anche nei terreni calcarei, resiste alle potature non troppo severe, e viene impiegata come albero da ombra in giardini e viali.

